

an. Cal.

# BOLLETTINO

DEI

## Musei di Zoologia ed Anatomia comparata

della R. Università di Torino

---

N. 193 pubblicato il 9 Gennaio 1895

VOL. X

---

Dott. ACHILLE GRIFFINI

### Una nuova Blattide raccolta nell'Isola di Candia

dal Dottor GIACOMO CECCONI.

Alcuni giorni or sono il dottor G. Cecconi mi inviava due specie di Ortotteri da lui raccolti nell'isola di Candia, che si era dimenticato di unire alla collezione precedentemente speditami, e della quale pubblicai il catalogo nelle *Miscellanea Entomologica* (1).

Di queste due specie l'una è un Grillide, l'*Oecanthus pellucens* (Scop.) Br., rappresentato da 2 ♂ (Calives), e non presenta nulla di rimarchevole. L'altra specie è una Blattide, riferibile al genere *Aphlebia* Brunner, e molto affine alla *A. pallida* Br., però notevolmente distinta. Essa si discosta poi ancor di più per varii caratteri da tutte le altre specie congeneri a me note, anche da quelle descritte dal dottor Krauss nel suo lavoro sulle Blattidi della Crimea (2).

Io descriverò pertanto questa forma, benchè non ne conosca che il ♂, come una sottospecie locale della *A. pallida*, rappresentante nell'isola di Candia, con dimensioni più piccole e con colorazione alquanto diversa, la suddetta specie propria della Grecia.

***Aphlebia pallida* subsp. *Cecconii* m.** — Mas: *Parvus, pallide testaceus. Caput pallide testaceum, fusco-variegatum; fronte fusca, vertice linea pallida ornato. Pronotum semiorbicolare, disco pallide ferru-*

---

(1) *Miscellanea Entomologica*, vol. II, 1894, N. 8.

(2) Dottor HERMANN KRAUSS. — Blattiden aus der Krim und aus West Kasien — Verhandl. der K. K. Zool. Bot. Gesellschaft in Wien, 1888. XXXVIII Band. (*A. polita*, *A. Retowskii* nn. ssp.).

NB. — Della *A. polita*, Krauss, pag. 569, tav. XV, fig. 2, esiste nel Museo Zoologico di Torino un ♂ proveniente dall'Armenia.

*gineo, marginibus late pallidis; disci ferruginei pars antica subtiliter fusco limbata. Elytra tota pallide testacea, venis vix indicatis; apice perfecte rotundata, abdomen tegentia. Alae rudimentariae. Pedes testacei. Abdomen supra nigro-piceum, segmentis singulis postice subtiliter pallide marginatis, segmentis duobus ultimis ferrugineo-testaceis, basi subtiliter irregulariterque fuscis.*

Long. corporis mm. 6; long. pronoti mm. 2; long. elytr. mm. 4.

*Habitat:* Topolia (Ins. Candia).

Ab *A. pallida* statura minore, abdominisque colore et pictura, praecipue distincta.